

Vorbereitung für die Endoskopie: Arabisch

أرشادات عامة خاصة بالتنظير الباطني

Gastroskopie - Magenspiegelung

قبل القيام لإجراء فحص التنظير للمعدة يجب أن تكون المعدة فارغة، و هذا يعني أنه عليك (أخي المراجع) أن تتوقف عن تناول الطعام بوقت مبكر يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً (أي الأمسيه قبل إجراء فحص التنظير)؛ و في صبيحة يوم التنظير للمعدة يجب عدم تناول الطعام و عدم تناول السوائل و عدم التدخين أما المرضى الذين يعانون من السكري أو من ضيق في مخرج المعدة فيحتاجون الى إرشادات خاصة بهم

تنظير الشرج/تنظير المستقيم السفلي

Proktoskopie

لا توجد تحضيرات أو اجراءات معينة من أجل هذا الفحص التنظيري للشرج أو المستقيم السفلي

ابتداءً نقوم نحن هنا في المستشفى باءطاء المريض جرعة عن طريق الفم لتفريغ المعدة و ذلك قبل الفحص بفترة وجيزة

تنظير المستقيم والمصران الغليظ السفلي

Rektosigmoidoskopie

في اليوم الذي يسبق الفحص التنظيري للمستقيم يتم تناول نصف زجاجة من المستحضر X-Prep وحتى الساعة الثانية بعد الظهر تكون قد انتهيت من شرب المستحضر هذا، بعدها يجب عليك أن تشرب 2-3 ليتر من السوائل (كافة السوائل التي تريدها)، و في المساء يجوز لك تناول وجبة عشاء عادية، أما المرضى الذين يعانون من أمراض صعبة في القلب أو الذين يعانون من الفشل الكلوي أو الذين يعانون من إنغلاق في الإمعاء فهؤلاء يحتاجون إلى إرشادات خاصة بهم

تنظير علوي للإمعاء

Coloskopie: Darmspiegelung

قبل إجراء الفحص التنظيري للإمعاء بثمانية أيام يجب أن يمتنع المريض عن أكل مشتقات الحبوب الخشنة، ويمتنع أيضاً عن أكل الفاكه التي لها بنور بداخلها، و في اليوم قبل الفحص التنظير يجب على المريض أن يتناول زجاجة كاملة من مستحضر X-Prep على أن يتم ذلك حتى الساعة الثانية بعد الظهر على الأكثر، و بعدها يجب على المريض أن يشرب ثلاثة لترات من السوائل (كل أنواع السوائل المحببة إليه)، و في المساء يسمح للمريض أن يتناول شوربة صافية فقط، وعند وجبة الإفطار يتناول الشاي أو لقهوه (مع السكر إن اراد)، أما التحضيرات الأخرى بواسطة مستحضر تنظيف الإمعاء فيتم ذلك يوم إجراء الفحص التنظير

نرجو أن تكون مستعداً و أن تهيء نفسك أن التحضير للفحص التنظيري، و الفحص بحد ذاته سيأخذان وقتك و يحددان بقاءك في المستشفى حتى آخر النهار، اما مرضى السكري أو الذين يعانون من أمراض القلب الصعبة أو الذين يعانون من الفشل الكلوي أو من إنغلاق في الأمعاء، فهؤلاء المرضى يحتاجون إلى إرشادات خاصة بهم لا تترددوا بالإستفسار و الحصول على معلومات بخصوص انتظير للأمعاء و ذلك عن طريق الإنترنت؛

http://chirinn.klinikum.uni-muenchen.de/patient/pat_01_05_021.html

تصوير و بيان وضع ونشاط المرارة

Gallengangsdarstellung (ERCP)

تعال إلى الفحص دون أن تأكل أو تشرب (على الريق) وهذى يتطلب منك أن تتوقف عن تناول الطعام في الأمسية التي تسبق الفحص للمرارة و تمتنع عن الطعام إعتباراً من الساعة الثامنة مساءً قبل الفحص؛ و في صباح يوم الفحص لا تأكل ولا تدخن، اما القهوة أو الشاي مع السكر مسموح بها؛ من أجل هذا الفحص الخاص بالمرارة تعطى من الطبيب حقنة تهدئة، ولذلك عليك أن تكون قد هبأت نفسك للبقاء في المستشفى حتى آخر النهار؛ و بناء على أخذك الحقنة المهدئة فلا يجوز لك في هذا اليوم من قيادة المركبات؛ أما مرضى السكري فيحتاجون بدورهم إلى إرشادات و توجيهات خاصة بهم من أجل هذا الفحص

معلومات عامة

ننصحكم أيها السادة والسيدات بإستعمال وسائل النقل العامة للوصول إلينا، حيث أنه من الأرجح قبل إجراء التنظير أن يعطى المريض حقنة للتهدئة؛ و يصبح المريض بعد هذه الحقنة المخدرة غير قادر على قيادة السيارات؛ عدا ذلك فإنه من الصعب الحصول على مكان لتوقيف سيارتك في مكان قريب من المستشفى بسبب كثرة السيارات و الزحمة في المدينة للإستفسار لا تترددوا بالإتصال معنا على هاتف
(089) 5160-2625
يسرنا كثيراً ان نزودكم بالمعلومات المطلوبة

Stand vom 26.10.00

Danke an Dr. Moutasem Daoud-Ghadieh

Kommentare an Matthias.Siebeck@ch-i.med.uni-muenchen.de